

A 卷

2024 全國潔牙觀摩賽 考試題目

<選擇題>8 題

1.() 至牙醫診所進行口腔檢查時，阻生齒何時為檢查重點？

- ①6-12 歲
- ②12-18 歲
- ③35-64 歲
- ④以上皆是

2.() 至牙醫診所進行口腔檢查時，以下何者是每 3 個月檢查一次？

- ①6-12 歲
- ②65 歲以上
- ③懷孕婦女
- ④以上皆是

3.() 牙間刷的使用，何者有誤？

- ①缺牙旁的牙齒，其鄰接面
- ②矯正器四周
- ③活動假牙的底部
- ④牙根分叉處

4.() 以下哪個正確？

- ①含氟漱口防齲計畫，開始於 1991 年，為期六年的先趨性成效評估計畫，發現可降低 26%齲齒率
- ②2011 年，12 歲學童齲齒率高達 79.3%，於 30 個 OECD 國家，我國排行倒數第三
- ③2012 年，12 歲恆齒齲齒指數為 2.5，與 34 個 OECD 國家，我國排行倒數第四
- ④以上皆正確

5.() 以下哪個不是現階段在台灣可以取得局部氟化物使用：

- ① 含氟牙膏
- ② 氟鹽
- ③ 含氟漱口水
- ④ 塗氟

6.() 國中生氟錠的建議使用劑量，以下何者正確：

- ①0.25mg，每日 1 顆
- ②0.25mg，每日 2 顆
- ③1mg，每日 1 顆

④不建議使用

7.() 以下何者不是易致齲食物？

- ①葡萄乾
- ②汽水
- ③玉米
- ④蜂蜜水

8.() 各年齡的刷牙方式，何者有誤？

- ①高中生(16-18 歲)貝氏刷牙法，自己刷，父母監督
- ②國小 4 年級(10 歲)學習貝氏刷牙法，自己刷，父母加強重點
- ③幼稚園大班(5-6 歲)水平來回刷，自己刷一遍，父母也再刷一遍
- ④0-3 歲，水平來回刷，父母負責潔牙

<填空題>12 格

9.口腔內的酸與氟化物的交互作用，造成 2 種作用，

當 脫鈣 作用> 再鈣化 作用時，會齲齒。

10.運用氟化物預防齲齒的方法大致分兩類，一是系統性使用方式，

如：氟錠、氟鹽、飲水加氟 等。

11.在許多氟化物的使用方法中，最多人運用的方式是含氟牙膏，含氟濃度

1000 PPM 以上

12.專業塗氟可降低齲齒發生率 20 %~ 40 %。

13.含氟漱口水建議長期使用下，至少 2 年，效果才會顯著。

14.0-3 歲含氟牙膏使用量為 米粒大小，

3 歲以上含氟牙膏使用量為 豌豆大小

15.我們過去習慣稱作牙菌斑，後來改稱作 牙菌斑生物膜

B 卷

2024 全國潔牙觀摩賽 考試題目

<選擇題>8 題

- 1.() 各年齡的刷牙方式，何者有誤？
 - ①高中生(16-18 歲)貝氏刷牙法，自己刷，父母監督
 - ②國小 4 年級(10 歲)學習貝氏刷牙法，自己刷，父母加強重點
 - ③幼稚園大班(5-6 歲)水平來回刷，自己刷一遍，父母也再刷一遍
 - ④0-3 歲，水平來回刷，父母負責潔牙

- 2.() 以下何者不是易致齲食物？
 - ①葡萄乾
 - ②汽水
 - ③玉米
 - ④蜂蜜水

- 3.() 國中生氟錠的建議使用劑量，以下何者正確：
 - ①0.25mg，每日 1 顆
 - ②0.25mg，每日 2 顆
 - ③1mg，每日 1 顆
 - ④不建議使用

- 4.() 以下哪個不是現階段在台灣可以取得局部氟化物使用：
 - ① 含氟牙膏
 - ② 氟鹽
 - ③ 含氟漱口水
 - ④ 塗氟

- 5.() 以下哪個正確？
 - ①含氟漱口防齲計畫，開始於 1991 年，為期六年的先趨性成效評估計畫，發現可降低 26%齲齒率
 - ②2011 年，12 歲學童齲齒率高達 79.3%，於 30 個 OECD 國家，我國排行倒數第三
 - ③2012 年，12 歲恆齒齲齒指數為 2.5，與 34 個 OECD 國家，我國排行倒數第四
 - ④以上皆正確

- 6.() 牙間刷的使用，何者有誤？
 - ①缺牙旁的牙齒，其鄰接面
 - ②矯正器四周
 - ③活動假牙的底部

④牙根分叉處

7.() 至牙醫診所進行口腔檢查時，以下何者是每 3 個月檢查一次？

- ①6-12 歲
- ②65 歲以上
- ③懷孕婦女
- ④以上皆是

8.() 至牙醫診所進行口腔檢查時，阻生齒何時為檢查重點？

- ①6-12 歲
- ②12-18 歲
- ③35-64 歲
- ④以上皆是

<填空題>12 格

9.我們過去習慣稱作牙菌斑，後來改稱作_____

10.0-3 歲含氟牙膏使用量為_____，
3 歲以上含氟牙膏使用量為_____

11.含氟漱口水建議長期使用下，至少_____年，效果才會顯著。

12.專業塗氟可降低齲齒發生率_____%~_____%。

13.在許多氟化物的使用方法中，最多人運用的方式是含氟牙膏，含氟濃度
_____PPM 以上

14.運用氟化物預防齲齒的方法大致分兩類，一是系統性使用方式，

如：_____、_____、_____等。

15.口腔內的酸與氟化物的交互作用，造成 2 種作用，

當_____作用>_____作用時，會齲齒。

C 卷

2024 全國潔牙觀摩賽 考試題目

<選擇題>8 題

1.() 至牙醫診所進行口腔檢查時，以下何者是每 3 個月檢查一次？

- ①6-12 歲
- ②65 歲以上
- ③懷孕婦女
- ④以上皆是

2.() 至牙醫診所進行口腔檢查時，阻生齒何時為檢查重點？

- ①6-12 歲
- ②12-18 歲
- ③35-64 歲
- ④以上皆是

3.() 以下哪個正確？

- ①含氟漱口防齲計畫，開始於 1991 年，為期六年的先趨性成效評估計畫，發現可降低 26%齲齒率
- ②2011 年，12 歲學童齲齒率高達 79.3%，於 30 個 OECD 國家，我國排行倒數第三
- ③2012 年，12 歲恆齒齲齒指數為 2.5，與 34 個 OECD 國家，我國排行倒數第四
- ④以上皆正確

4.() 牙間刷的使用，何者有誤？

- ①缺牙旁的牙齒，其鄰接面
- ②矯正器四周
- ③活動假牙的底部
- ④牙根分叉處

5.() 以下哪個不是現階段在台灣可以取得局部氟化物使用：

- ① 含氟牙膏 ② 氟鹽 ③ 含氟漱口水 ④ 塗氟

6.() 以下何者不是易致齲食物？

- ①葡萄乾
- ②汽水
- ③玉米

④蜂蜜水

7.() 國中生氟錠的建議使用劑量，以下何者正確：

- ①0.25mg，每日 1 顆
- ②0.25mg，每日 2 顆
- ③1mg，每日 1 顆
- ④不建議使用

8.() 各年齡的刷牙方式，何者有誤？

- ①高中生(16-18 歲)貝氏刷牙法，自己刷，父母監督
- ②國小 4 年級(10 歲)學習貝氏刷牙法，自己刷，父母加強重點
- ③幼稚園大班(5-6 歲)水平來回刷，自己刷一遍，父母也再刷一遍
- ④0-3 歲，水平來回刷，父母負責潔牙

<填空題>12 格

9.運用氟化物預防齲齒的方法大致分兩類，一是系統性使用方式，

如：_____、_____、_____等。

10.口腔內的酸與氟化物的交互作用，造成 2 種作用，

當_____作用>_____作用時，會齲齒。

11.專業塗氟可降低齲齒發生率_____ %~_____ %。

12.在許多氟化物的使用方法中，最多人運用的方式是含氟牙膏，含氟濃度

_____ PPM 以上

13.0-3 歲含氟牙膏使用量為_____，

3 歲以上含氟牙膏使用量為_____

14.含氟漱口水建議長期使用下，至少_____年，效果才會顯著。

15.我們過去習慣稱作牙菌斑，後來改稱作_____

<選擇題>8 題

3.() 牙間刷的使用，何者有誤？

- ①缺牙旁的牙齒，其鄰接面
- ②矯正器四周
- ③活動假牙的底部
- ④牙根分叉處

5.() 以下哪個不是現階段在台灣可以取得局部氟化物使用：

- ① 含氟牙膏 ② 氟鹽 ③ 含氟漱口水 ④ 塗氟

7.() 以下何者不是易致齲食物？

- ①葡萄乾
- ②汽水
- ③玉米
- ④蜂蜜水

2.() 至牙醫診所進行口腔檢查時，以下何者是每 3 個月檢查一次？

- ①6-12 歲
- ②65 歲以上
- ③懷孕婦女
- ④以上皆是

4.() 以下哪個正確？

- ①含氟漱口防齲計畫，開始於 1991 年，為期六年的先趨性成效評估計畫，發現可降低 26%齲齒率
- ②2011 年，12 歲學童齲齒率高達 79.3%，於 30 個 OECD 國家，我國排行倒數第三
- ③2012 年，12 歲恆齒齲齒指數為 2.5，與 34 個 OECD 國家，我國排行倒數第四
- ④以上皆正確

6.() 國中生氟錠的建議使用劑量，以下何者正確：

- ①0.25mg，每日 1 顆
- ②0.25mg，每日 2 顆
- ③1mg，每日 1 顆

④不建議使用

8.() 各年齡的刷牙方式，何者有誤？

- ①高中生(16-18 歲)貝氏刷牙法，自己刷，父母監督
- ②國小 4 年級(10 歲)學習貝氏刷牙法，自己刷，父母加強重點
- ③幼稚園大班(5-6 歲)水平來回刷，自己刷一遍，父母也再刷一遍
- ④0-3 歲，水平來回刷，父母負責潔牙

1.() 至牙醫診所進行口腔檢查時，阻生齒何時為檢查重點？

- ①6-12 歲
- ②12-18 歲
- ③35-64 歲
- ④以上皆是

<填空題>12 格

10.運用氟化物預防齲齒的方法大致分兩類，一是系統性使用方式，

如：_____、_____、_____等。

9.口腔內的酸與氟化物的交互作用，造成 2 種作用，

當_____作用>_____作用時，會齲齒。

12.專業塗氟可降低齲齒發生率_____ %~_____ %。

13.含氟漱口水建議長期使用下，至少_____年，效果才會顯著。

14.0-3 歲含氟牙膏使用量為_____，

3 歲以上含氟牙膏使用量為_____

11.在許多氟化物的使用方法中，最多人運用的方式是含氟牙膏，含氟濃度

_____PPM 以上

15.我們過去習慣稱作牙菌斑，後來改稱作_____